

# QUE FAIRE AU RUCHER?

## En Avril vous aurez fait:



- Dans les régions septentrionales, pratiquer les inversions de corps pour ceux qui ont des ruches divisibles.

- Dans ces mêmes régions débiter l'élevage des reines.

- Dans les régions méridionales, constituer les nucléis qui seront les ruches de production de l'année prochaine, voire pour la saison estivale. Cette opération peut s'effectuer dans les autres régions si les conditions météorologiques s'y prêtent fin avril-début mai.

- Là où les ruches sont fortes, débiter les divisions de ruches pour augmenter l'effectif du rucher, remplacer les ruches décimées au cours de l'hiver et contrer l'essaimage.
- Continuer le piégeage du frelon asiatique.
- Mettre les hausses dès que possible.
- Préparer le matériel d'extraction.
- Profiter des miellées pour faire bâtir des cadres de cire gaufrée.
- Piéger *Varroa* avec du couvain mâle.
- Si les miellées sont conséquentes, contrôler les cadres de hausse. Dès qu'ils sont operculés aux trois quarts, les prélever pour les passer à l'extraction.
- Préparer les aires et le matériel de transhumance pour ceux qui doivent déplacer leurs ruches.
- Ne pas hésiter à réunir les ruches trop faibles.



## En Mai vous ferez:

- Profiter des miellées pour bâtir et remplacer vos cires dans le ou les corps de ruche, faire construire des cires dans les hausses qui donneront des cellules d'ouvrières, mettre des cadres sans cire gaufrée dans les corps de ruche pour la construction de cellules de mâles qui serviront au printemps prochain pour développer le couvain de faux bourdons dans les ruches sélectionnées.



- Organiser les transhumances.
- Pratiquer l'élevage des reines.
- Constituer des nucléis et vérifier la ponte de la reine.
- Faire les extractions des cadres au fur et à mesure que les récoltes mûrissent, bien séparer les différentes miellées.
- Bien laisser décanter le miel dans les maturateurs, une dizaine de jours au minimum.
- Traiter les nucléis contre la varroase avec des produits par évaporation si la température le permet.
- Continuer la découpe du couvain mâle et vérifier son degré d'infestation pour se renseigner sur la situation.
- Contrôler toujours les éventuels essaimages, pratiquer s'il y a lieu la division de ruche ou l'essaimage artificiel pour détenir des reines jeunes.
- Effectuer des nourrissements de stimulation de ponte sur les nucléis, pour détenir des colonies les plus fortes possible qui serviront éventuellement aux dernières récoltes estivales pour l'entrée en automne.
- Effectuer les derniers piégeages de reines de frelon asiatique. Fin mai-début juin, mettre fin à cette première forme de piégeage de l'année.

\* \* \*